

Actualización de datos del Registro Estatal de Lepra, año 2023 Centro Nacional de Epidemiología. Datos a 31/12/2023

Durante el año 2023 se notificaron al Registro Estatal de Lepra **6** casos incidentes (casos nuevos). La clínica fue multibacilar en **4** casos y paucibacilar en **2** casos. El tratamiento utilizado en **3** casos fue la multiterapia recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en **1** caso Otra Terapia y en **2** casos Monoterapia. En la distribución por sexo se observaron **3** mujer y **3** hombres.

En los **6** casos consta un país de contagio distinto de España: Bolivia (3), Senegal (1), Sudan (1) y Paraguay (1).

Incidencia de lepra por grupos de edad y sexo, año 2023 Registro Estatal de Lepra. España.

Grupos de edad	Hombres	Mujeres	Total
0 – 14	0	0	0
15 – 24	1	1	2
25 – 44	2	1	3
45 – 64	0	1	1
65 y más	0	0	0
Total Estatal	3	3	6

A 31 de diciembre de 2023 había **16** casos prevalentes registrados. En la tabla adjunta se expone la distribución geográfica de los casos nuevos y prevalentes por comunidad autónoma de residencia:

Incidencia y prevalencia de lepra por comunidad autónoma de residencia, años 2022 y 2023. Registro Estatal de Lepra. España.

CCAA	2023		2022	
	Casos nuevos	Casos prevalentes ¹	Casos nuevos	Casos prevalentes
Andalucía	1	3	1	3
Aragón	0	0	0	0
Asturias	0	0	2	2
Baleares	0	3	2	4
Canarias	1	1	0	0
Cantabria	0	0	1	1
Castilla-La Mancha	0	0	0	0
Castilla y León	0	0	0	0
Cataluña	2	2	0	0
C. Valenciana	0	3	1	3
Extremadura	0	0	0	0
Galicia	0	1	1	2
Madrid	2	2	0	1
Murcia	0	0	1	1
Navarra	0	0	0	0
País Vasco	0	0	0	1
La Rioja	0	1	1	1
Ceuta	0	0	0	0
Melilla	0	0	0	0
Total Estatal	(6²) 6	16	(8²) 10	19

¹ Los casos que terminaron el tratamiento en el año 2023 no están incluidos entre los casos prevalentes.

² Número de casos en personas de otros países y con residencia actual en España

El número de casos nuevos de lepra en España en 2023 disminuyó en relación al año 2022. La tendencia de los casos nuevos, tanto autóctonos como importados, reflejó un ligero descenso en el último quinquenio. Respecto a los casos prevalentes, se mantiene la tendencia debido a la actualización de la información y el seguimiento de los casos hasta la finalización del tratamiento. Los clínicos deben mantener la sospecha diagnóstica de lepra en personas procedentes de países endémicos.